

□ 1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ. (各 1 点)

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

解答)

$$|tE - A| = \begin{vmatrix} t-1 & 1 \\ 1 & t-1 \end{vmatrix} = (t-1)^2 - 1^2 = t^2 - 2t = t(t-2).$$

従って A の固有値は $\lambda = 0, 2$

(2) A の固有ベクトル \mathbf{x} を全て求めよ.

解答)

• $\lambda = 0$ のとき, $A - 0E = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $A\mathbf{x} = 0$ を解いて, 固有ベクトル

$$\text{は } \mathbf{x}_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_1 \neq 0).$$

• $\lambda = 2$ のとき, $A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{簡約化}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $(A - 2E)\mathbf{x} = 0$ を解いて, 固有ベクトル

$$\text{は } \mathbf{x}_2 = t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_2 \neq 0).$$

(3) A を対角化せよ.

解答) $P = (\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とおけば, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ となる.¹

(4) A^n (n は自然数) を求めよ. (ヒント: $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ のとき, $A^n = P \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ 0 & \beta^n \end{pmatrix} P^{-1}$)

解答) $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列は $P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ である. よって,

$$\begin{aligned} A^n &= P \begin{pmatrix} 0^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -2^n \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2^n & -2^n \\ -2^n & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & -2^{n-1} \\ -2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

¹ $P = (\mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ とおけば, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ となる. これも正解である. この P で対角化しても, 次の問題 (4) で A^n の計算結果は同じになる.

¹※この講義に関する情報はホームページを参照. <http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2015/la1.html>